

# 効能・効果および用法・用量追加のご案内

フリーラジカルスカベンジャー

**ラジカット**<sup>®</sup> 注30mg  
点滴静注バッグ30mg

**RADICUT**<sup>®</sup> inj.30mg (日本薬局方 エダラボン注射液)

**RADICUT**<sup>®</sup> BAG for I.V. Infusion30mg (エダラボン注射剤)

2015年6月

田辺三菱製薬株式会社

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ラジカット<sup>®</sup> 注30mg・点滴静注バッグ30mgにつきまして、下記の通り、「筋萎縮性側索硬化症（ALS）における機能障害の進行抑制」の効能・効果および用法・用量の追加が承認されましたので、ご案内申し上げます。

今後ともさらなるご指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

## 承認内容

### ■【効能・効果】、【用法・用量】の効能追加内容

【効能・効果】	筋萎縮性側索硬化症（ALS）における機能障害の進行抑制
【用法・用量】	<ラジカット注> 通常、成人に1回2管（エダラボンとして60mg）を適量の生理食塩液等で用時希釈し、60分かけて1日1回点滴静注を行う。 通常、本剤投与期と休薬期を組み合わせた28日間を1クールとし、これを繰り返す。 第1クールは14日間連日投与する投与期の後14日間休薬し、第2クール以降は14日間のうち10日間投与する投与期の後14日間休薬する。
	<ラジカット点滴静注バッグ> 通常、成人に1回2袋（エダラボンとして60mg）を、60分かけて1日1回点滴静注を行う。 通常、本剤投与期と休薬期を組み合わせた28日間を1クールとし、これを繰り返す。 第1クールは14日間連日投与する投与期の後14日間休薬し、第2クール以降は14日間のうち10日間投与する投与期の後14日間休薬する。

- 効能・効果および用法・用量の追加に伴い、「使用上の注意」等の添付文書の内容を改訂しました。「使用上の注意」等の詳細は、添付文書等をご参照ください。



製造販売元  
田辺三菱製薬株式会社  
大阪市中央区道修町3-2-10